

Leukämische Myelosen, Lymphadenosen und sarkomartige Neubildungen nach Injektion von Gallensubstanzen

Inaugural-Dissertation
zur
Erlangung der Doktorwürde
der
Hohen Medizinischen Fakultät
der
Rheinischen Friedrich Wilhelms-Universität
zu Bonn

Vorgelegt am 6. Dezember 1937 von
Rita Uiker
aus Karlsruhe i. B.

Bonn 1938

Buchdruckerei Joseph HeideImann

Gedruckt mit Genehmigung der medizinischen Fakultät
der Universität Bonn

Referent: Prof. Dr. M. Bürger

Korreferent: Prof. Dr. Martini



Dem Andenken meiner Mutter!



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41546405_0085

Die Kenntnisse des Sterinhaushaltes sind in den letzten Jahren zunehmend vertieft worden. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.) Sowohl in physiologischer, wie in pathologischer Hinsicht sind eine große Reihe von Tatsachen neu aufgedeckt worden. Die wichtigsten sind einerseits die Beziehungen der Sterine zu den Sexualhormonen, welche durch Windaus, Butenandt u. a. geklärt wurden, auf der anderen Seite die Beziehungen zu den Lipovitaminen (Ergosterin).

Neue Ausblicke eröffneten sich, als durch die Arbeiten von Wieland (8), Cook (9) Beziehungen zwischen den Sterinen und carcinogenen Substanzen aufgedeckt und im Tierversuch erwiesen wurden; die meisten dieser carcinogenen Substanzen leiten sich aus Teerprodukten her (10) (Phenantren, Antrazen, Chrysen und Pyren). Diese Substanzen stehen mit den zu den Sterinen gehörenden Sexualhormonen, chemisch und teilweise auch biologisch in enger Beziehung. Das Cholesterin selbst ist, wie frühere Autoren bereits festgestellt haben, nicht imstande, echte Tumoren hervorzurufen, wohl aber Substanzen, die sich von den Gallensäuren herleiten, mit denen das Cholesterin chemisch sehr enge Verwandtschaft hat. Nachstehende Formelbilder mögen diese chemischen Beziehungen erläutern.

Wenn solche oder ähnliche Substanzen im menschlichen oder tierischen Körper auftreten sollten, so wären sie am ehesten unter den unverseifbaren Substanzen zu suchen, unter denen wir auch die Abbauprodukte des Cholesterins vermuten. Bereits im Jahre 1912 hat Wacker (11) darauf hingewiesen, daß die Menge der sogenannten unverseifbaren Substanzen und damit auch des Cholesterins im menschlichen Depotfett beim Carcinom stark vermehrt vorkommt. Wenn auch dieser Befund für Carcinom nicht spezifisch ist, weil er sich auch bei anderen konsumierenden Erkrankungen z. B. Tuberkulose findet, so kommt ihm doch in diesem Zusammenhang fraglos eine Bedeutung zu, insofern gerade auch die wachsartige unverseifbare Begleitsubstanz des Cholesterins beim Carcinom die allerhöchsten Werte aufweist.

Die Natur dieser unverseifbaren Substanzen ist bis heute nicht geklärt (12). Blankenburg (13) hat sich auf Veranlassung Bürgers bemüht, die unverseifbaren Begleitstoffe mit den Sterinen im Hauffett zu klären und hat dabei Eikosyl- und Cetyl-Alkohol gefunden und als solche identifiziert.

Die Frage, ob die Entdeckung von Wieland und Cook von der carcinogenen Wirksamkeit des Methylcholantren auch für die menschliche Galle Bedeutung hat, ist einer direkten Prüfung unzugänglich. Wegen der engen Beziehungen des Methylcholantrens zu den Gallensäuren erschien es mir aussichtsreich, die menschliche Galle auf tumorerzeugende Eigenschaften zu prüfen. Die erste Reihe dieser Untersuchungen hatte insofern ein unerwartetes Resultat, da die zu den Untersuchungen herangezogenen Mäusen an schweren Gewebsveränderungen erkrankten und schließlich zugrunde gingen. Die histologischen Schnitte zeigten dieselben Veränderungen wie die der menschlichen Leukämie und waren von den Gewebsbildern der menschlichen Leukämie kaum zu unterscheiden. Über diese erste Reihe der Untersuchungen ist von Bürger und Uiker in der Kli. Wo. Nr. 10 berichtet worden. Da diese leukämischen Zustände unerwartet kamen, waren zunächst systematische Blutuntersuchungen unterblieben. Eine zweite Reihe von Untersuchungen, über die hier berichtet wird, beschäftigt sich mit der Frage der Blutzusammensetzung nach Applikation von Gallensubstanzen. Die mit besonderen Kautelen behandelten Tiere wurden alle „chronisch krank“. Sie bekamen eine schwere Veränderung des Blutes, der Leber, der Milz und auch der Haut und starben bei wöchentlich zweimaliger Applikation im Zeitraum von 4—8 Wochen nach Versuchsbeginn. Die histologischen Untersuchungen der Leber, der Milz, Haut und auch des Blutes zeigen Bilder, welche denen der menschlichen Leukämie stark ähneln, resp. mit ihnen identisch sind. Die Galle wurde mir, dank dem Entgegenkommen von Herrn Prof. Dr. Ceelen, dem ich an dieser Stelle hierfür meinen verbindlichsten Dank aussprechen möchte, aus dem pathologischen Institut in Bonn zur Verfügung gestellt. Ich habe stets Blasengalle verwendet und dieselbe auf Bilirubin, Gesamtstickstoff, freies Cholesterin und Wassergehalt untersucht. Um sichere quantitative Beziehungen zu haben, bin ich bei der Dosierung stets vom Trocken-

rückstand ausgegangen. In nachstehender Tabelle gebe ich einige Gallenanalysenwerte wieder.

Ich verfüge im ganzen über 86 Analysenwerte von menschlichen Leichengallen, es ist mir aber nicht möglich zu sagen, ob und welche chemische Unterschiede zwischen der Blaugalle von Carcinomträgern und solcher Leute, die an anderen Erkrankungen gestorben sind, bestehen.

1. Teil.

Wie bei den ersten Versuchen, bei denen es zu leukämieartigen Gewebsveränderungen kam, ging ich auch diesmal von einer 5% Trockengalle-Olivenölemulsion aus, die folgendermaßen bereitet wurde: 50 mg Trockengalle wurden mit 1—2 Tropfen aqua dest. angerührt und mit einem ccm Olivenöl kräftig verrieben. Von dieser öligen Aufschwemmung injizierte ich zweimal wöchentlich 0,25 ccm pro Maus unter die Rückenhaut. Die Versuchsreihe, welche auch an unerwachsenen Mäusen angestellt wurde, führte zu demselben Erfolg. Die Ernährung der Mäuse war immer dieselbe: Milch, Weißbrot mit Graubrot abwechselnd.

Von den in diesen Versuch einbezogenen Tieren wurde vor Versuchsbeginn zuerst eine Kontrollzählung gemacht. Die gefundenen Werte schwankten zwischen 6—11 000. Im Differentialblutbild hatten sämtliche Tiere eine Lymphocytose von durchschnittlich 70—75%. Unreife Zellformen konnte ich nur ganz vereinzelt feststellen. Schon nach der ersten Injektion stiegen die Leukocytenwerte erheblich an, in 3 Fällen um 12 000. Bei den weiteren Injektionen nahmen die Zellzahlen immer mehr zu; mit dem Ansteigen der Leukocytenwerte traten gleichzeitig unreife Zellformen auf, die oft schwierig einzureihen waren.

Die Blutzählungen und die Blutaustriebe wurden von den Mäusen Nr. M₁, M₂, M₃, M₄, M₅ und M₆ gemacht. Ich begann mit den Blutzählungen am 13. 4. 37 und setzte sie bis zum Tode der Tiere systematisch fort. Die ersten 4 Wochen machte ich die Blutzählungen immer in 3—4tägigen Intervallen, dann nur noch in 7tägigen Intervallen, da die Tiere eine starke hämorrhagische Diathese bekamen, die sich in einer stark verlängerten Blutungszeit

äußerte. Ich tauchte deshalb die abgechnittenen Schwanzenden, aus denen das Blut gewonnen wurde, in 10% Calciumlösung, um eine schnellere Gerinnung zu erreichen; auch Hamamelis erwies sich für die Blutstillung ganz geeignet, war jedoch wie auch das 10%-Calcium nicht ausreichend in seiner Wirkung. Am besten erwies sich die von Kohl hergestellte Mischung von Redoxon-Histidin-Calcium.

Die Zählungen wurden mit der Zeiß Thomaschen Zählkammer vorgenommen. Die Ausstriche wurden nach May-Grünwald-Giemsa gefärbt; ferner wurde von einem zweiten Ausstrich eine Oxydasereaktion gemacht, da eine Differenzierung der schon frühzeitig auftretenden unreifen Zellen oft nur sehr schwierig war.

Die Tiere zeigten alle zu Beginn der Behandlung eine ausgesprochene Lymphocytose, was ja bei der Maus normalerweise der Fall ist. Die Oxydasereaktion war negativ. Von diesen 6 systematisch untersuchten Tieren hatten 2 Tiere bis zum Tode ausgesprochene Lymphocytosen, während bei 4 Tieren große Zellen auftraten, die einen runden Kern hatten; das Protoplasma war sehr schmal und reichte bis zum Kern; die Oxydasereaktion fiel negativ aus. Im Laufe der Weiterbehandlung traten Zellen auf, die einen plumpen Kern hatten, der bohnenförmig gebogen war und in einigen Fällen die Form eines Ringes annahm. In diesem Fall fiel die Oxydasereaktion positiv aus. Es kam somit zu einer Verschiebung der Lymphocyten zu großen Zellen, die nach ihrer Oxydasehaltigkeit zu der myeloischen Gruppe zu rechnen sind.

Nachfolgend will ich einige Abbildungen von den Blutbildern bringen. Abbild. 1 zeigt ein Übersichtsbild in schwacher Vergrößerung; wir bekommen einen kleinen Überblick über die Anzahl der weißen Zellen, die in Anbetracht des dünnen Blutaustreiches auffallend stark vermehrt sind. Bei einem normalen Blutbild findet man niemals so massenhaft Leukocyten. Aus den weiteren Abbildungen geht deutlich hervor, daß es sich nicht um eine reine Leukocytose handelt, denn dann würden wir nie diese große Anzahl von unreifen Zellformen finden, wie wir aus den Abbildungen 2, 3 und 4 ersehen können.

Mikrophotogramm eines Mauseblutbildes bei schwacher Vergrößer.

Normalerweise findet man in einem gewöhnlichen Blutausstrich rund 25% Lymphocyten. In diesem Fall erreichten die Lymphocyten nur 3%. Abbildungen 2, 3, 4 stellen Auschnitte aus verschiedenen Blutbildern dar. In sämtlichen Fällen finden wir massenhaft viele unreife Zellformen, die alle aus der myeloischen Reihe stammen. In Abbildung 2 finden wir mehr unreife Zellformen als reife. Die für eine Leukämie festgesetzte Bedingung, daß unreife Zellen im Blutbild vorhanden sein müssen, im Gegensatz zu einer reinen Leukocytose, ist hier bestimmt erfüllt. Es handelt sich also hier nicht nur um eine Vermehrung der Gesamtleukocyten, sondern auch um eine starke Vermehrung von unreifen weißen Blutkörperchen, die nach ihrer Oxydasehaltigkeit zu der myeloischen Gruppe gehören. Durch eine starke Hyperplasie des Knochenmarks und des gesamten leukopoetischen Apparates wurden die Zellen noch unreif in das periphere Blut abgegeben; sie hatten also nicht ihren normalen Ausreifungsvorgang im Knochenmark durchgemacht.

Abb. 2. Mikrophotogramm eines Maueblutbildes. (Maus M₁.)

Stark polichromatische Erythrocyten; wir sehen 4 Metamyelocyten und 3 neutrophile segmentkernige Leukocyten.

In den Abbildungen 3 und 4 sehen wir verhältnismäßig wenig Myeloblasten, dagegen viele Myelocyten. Nach Naegeli's Klassifizierung dieser unreifen Zellen in Myeloblast, Myelocyt, Promyelocyt und Metamyelocyt, habe ich in Anbetracht der großen Ähnlichkeit mit den von Naegeli beschriebenen Zellformen für diese unreifen Zellen dieselben Worte gewählt.

Abb. 3. Blutbild von Maus M₂.

Abb. 4. Blutbild von Maus M₅.

Obwohl die Tiere Maus M₁, M₂ und M₅ in verhältnismäßig kurzer Zeit nach Versuchsbeginn starben, und man auf grund dieser Tatsache die Diagnose: „akute Leukämie“ stellen könnte, so zeigt uns doch das Blutbild, daß die unreifsten Formen der myeloischen Reihe, nämlich die Myeloblasten, wie wir sie fast nur bei der akuten Leukämie finden, verhältnismäßig wenig vertreten sind; es decken sich hier die Blutbefunde nicht ganz mit dem raschen Verlauf der

Krankheit. Wir finden hier vielmehr Myelocyten und Metamyelocyten, wie wir sie bei der chronischen myeloischen Leukämie antreffen. Auf grund der Blutbilder ist man eher geneigt, die Diagnose „chronische myeloische Leukämie“ zu stellen, während die Versuchsdauer eher für eine akute Leukämie spricht.

Der erwähnte Erfolg erweckte die Hoffnung, auf diese Weise eine autonome Wucherung des hämatopoetischen Apparates zu erzeugen. Daß es sich bei den im ersten Teil besprochenen Mäusen um eine autonome Wucherung handelte, war noch nicht nachgewiesen. Es kam also darauf an, Mäuse in diesen Zustand zu bringen und dann mit der Galledarreichung aufzuhören, um zu sehen, ob das hämatopoetische Gewebe weiter in Wucherung gerate, oder ob die wöchentlich beobachtete Steigerung der Leukocyten wieder zurückgehen würde. Die Tiere wurden nun nicht mehr weiter gespritzt, wohl aber wurden die Blutuntersuchungen wöchentlich weitergeführt. Dabei stellte sich heraus, daß die Tiere, obwohl sie nicht mehr gespritzt wurden, ständig eine Vermehrung ihrer Leukocytenwerte erfuhren, daß also die im peripheren Blute festgestellte Leukocytose nicht rein chemisch bedingt sein konnte. Die unreifen Zellformen nahmen immer mehr zu. Eine Differenzierung war oft sehr schwer und konnte häufig nur durch Oxydase gesichert werden.

II. Teil.

Die Ergebnisse der ersten Versuchsreihe kamen mir überaus überraschend. Die Tiere überdauerten die Versuchsanordnung im höchsten Falle 10 Wochen. Die Zeit war zu kurz, um eine Entwicklung von Neoplasmen zu bekommen, was ja ursprünglich auf grund der eingangs dargelegten chemischen Verwandtschaft des Cholesterins, der Gallensäuren und des Methylcholantrens beabsichtigt war. Aus diesem Grunde setzte ich neue Versuche an, die ich hier kurz erwähnen möchte.

In drei Parallelversuchen, die jedesmal 7 Mäuse erfaßten, spritzte ich die Tiere nur einmal wöchentlich. Die Tiere überdauerten diese Versuchsanordnung wesentlich länger, bis zu 8—9 Monaten. Die Ergebnisse waren sehr interessant. Von den 21 in diesen Versuch einbezogenen Tieren, bekamen 13 Tiere Tumoren, 8 Tiere Leukämien. Von den 13 Tumortieren hatten 2 Tiere gleichzeitig

eine lymphatische Leukämie. In nachstehenden Abbildungen möchte ich eine dieser Leukämien von einem Tumortier zeigen.

Die Abb. 5 zeigt die Leber einer Maus, die einen etwa bohnen-großen Tumor am Rücken hatte. Das Tier wurde 24mal mit einer 5%igen Trockengalle-Olivenöl-Emulsion gespritzt. Die Injektionen wurden nur einmal wöchentlich gemacht. Die Galle stammte von einem 74jährigen, an Oesophagus-Ca. mit Lebermetastasen gestorbenen Patienten. Die Gesamtmenge an Trockensubstanz, die für die Injektion verwendet wurde, betrug 300 mg.

Die Leber ist sehr schwer verändert. Fast in der ganzen Leber ist es um die Gefäße herum zur Lymphombildung gekommen. In den Blutgefäßen findet man auch hier mehr weiße als rote Blutkörperchen. Die Veränderungen gleichen vollkommen denen, wie sie bereits in der Klin. Wo. besprochen wurden.

Die Abb. 6 zeigt die Milz des gleichen Tieres. Auch hier ist die Pulpa stark gewuchert und hat die Follikel fast vollkommen erdrückt. Man sieht hier auch sehr schön einige Megakaryocyten.

Leber.

Abb. 5. Mikrophotogramm einer Mauleber, 45fache Vergrößerung

Milz.

Abb. 6. Mikrophotogramm einer Maufemilz, 95fache Vergrößerung

Auch hier wechselten in den Leukämiefällen lymphatische Leukämie mit myeloischer Leukämie ab. Die bei den 13 Tieren erzeugten Tumoren waren im wesentlichen Lymphofarkome und Rundzellenfarkome, die oft sehr schwer zu trennen waren. In den meisten Fällen konnte ich fließende Übergänge feststellen. Metastasen traf ich in einem Falle an. Es handelte sich hierbei um einen Schilddrüsentumor, mit ausgedehnten Lungenmetastasen. Erwähnen möchte ich noch, daß die Tumoren nicht an der Injektionsstelle auftraten. Die Tumoren zeigten sehr malignen Charakter; sie breiteten sich ohne Rücksicht auf die benachbarten Organe aus (Leber, Milz, Niere). Infiltrierendes und destruierendes Wachstum konnte ich bei sämtlichen Neubildungen feststellen. Zwei nachstehende Abbildungen sollen die geschilderten Veränderungen besser veranschaulichen.

Die Abb. 7 und 8 stammen von einer Maus, die 2mal mit einer 5%igen Trockengalle-Olivenöl-Emulsion gespritzt worden war. Die Gesamtmenge der Trockensubstanz betrug 262,5 mg. Die Galle stammte von einem 56jährigen an Peritonitis gestorbenen Patienten.

Nach etwa 6wöchentlicher Behandlung zeigte das Tier am Rücken einen erbsengroßen Tumor, der stets an Größe zunahm und am Ende des 4. Monats des Versuchsbeginnes bohngroß war. Das Tier starb wenige Tage später. Bei der Sektion fand sich außer dem Hauttumor noch ein Tumor von Niere und Milz vor. Die Leber war leicht vergrößert, zeigte aber makroskopisch wie auch mikroskopisch keine besonderen Veränderungen. Die Mesenterialdrüsen waren leicht geschwollen, sonst o. B.

Die Abb. 7 zeigt den Hauttumor dieses Tieres. Man erkennt deutlich die Reste von noch übriggebliebener quergestreifter Muskulatur. Ein rasch sich ausbreitendes Gewebe, das aus lauter kleinen runden Zellen besteht, hat die Muskulatur völlig zerstört.

In Abb. 8 treffen wir in dem Nieren-Milztumor dieselben Zellen an. Von Glomerulie ist fast nichts mehr zu sehen. Die übriggebliebenen Harnkanälchen sind vollgepfropft mit Zylinder. An einigen Stellen finden sich zusammengelagerte Epithelzellen. Ob das noch Reste von Harnkanälchen sind, oder ob die Niere versucht hat für die ihr verloren gegangenen Glomerulie neue Gefäßknäuel zu bilden, — einen ähnlichen Vorgang finden wir ja auch in der Leber, — kann hier nicht entschieden werden.

Haut-Tumor

Niere-Milz-Tumor.

Maus mit Nieren-Tumor.

Das Tier wurde 25mal mit 0,25 ccm einer Trockengalle-Olivenöl-Emulsion gespritzt. Die Gesamtmenge an Trockengalle betrug 312,5 mg. Die Galle stammt von einem 56jährigen an Peritonitis gestorbenen Patienten.

Ferner konnte ich feststellen, daß die Tiere schon in den ersten Wochen eine starke Schädigung des roten Blutbildes erfahren hatten und zwar im Sinne einer starken Polichromasie mit ausgesprochenen basophilen Erythrocyten und vereinzelt auch kernhaltigen roten

Blutkörperchen. Auf den ersten Blick erinnerten die Blutbilder an die der perniziösen Anämie. Vielleicht besteht doch eine gemeinsame pathogenetische Basis zwischen Leukämie und perniziöser Anämie, eine Ansicht, die vor allem durch *Ellermann* (14) vertreten wird. Aus klinischen Erfahrungen wissen wir, daß man in der Tat Fällen begegnet, die zuerst nur das Bild einer schweren Anämie zeigen, später dagegen einen typisch leukämischen Befund aufweisen. Diese Fälle scheinen vielleicht doch einen inneren Zusammenhang zwischen schwerer Anämie und Leukämie zu beweisen, daß eine Wesensverwandtschaft beider Prozesse besteht. Vielleicht sind es in der Leber gebildeten Substanzen noch unbekannter Natur, die in der Galle ausgeschieden werden, durch deren Überangebot, sowie durch deren Fehlen es zu einer Störung des physiologischen Gleichgewichtes im hämatopoetischen Apparat kommen kann. Daß in der Galle enthaltene Substanzen Knochenmarkswirkung haben, wurde durch Untersuchungen von *Seyderhelm* und *Thammann* (15) erwiesen. Diese Autoren konnten durch Anlegen von Gallen fisteln eine schwere Anämie erzeugen, welche durch perorale Zufuhr von Galle relativ rasch wieder ausgeglichen werden konnte. Vielleicht beruht hierauf auch die Wirksamkeit der Lebertherapie bei der Perniciofa.

Von einigen Autoren (16, 17, 18) wird die Ansicht vertreten, daß die Leukämien nichts anderes als bösartige Geschwülste des hämatopoetischen Apparates sind; *Banti* (16) nennt die Leukämie geradezu eine „Systematische Sarkomatose“ der blutbildenden Gewebe und daher wird folgerichtig von diesen Forschern die leukämische Blutalteration als auf Aufschwemmung von Tumorzellen beruhend, angesehen.

In der Tat läßt sich nicht leugnen, daß nicht so ganz selten Leukämien beobachtet werden, die zum Teil schon klinisch, vor allem aber makroskopisch anatomisch eine sehr weitgehende Ähnlichkeit mit den malignen Neoplasmen, speziell mit den Sarkomen insofern zeigen, als sie mit der Entwicklung großer, zum Teil multipler Geschwülste einhergehen. *Sternberg* bezeichnet dieses Krankheitsbild, bei dem außerdem ein atypischer Blutbefund vorhanden war, als „Leukosarkomatose“. Heute wissen wir aber, daß es auch Formen von multiplen leukämischen Geschwulstbildungen gibt, die

ein einwandfrei leukämisches Blutbild zeigen. Eine eindeutige Abgrenzung ist nicht immer möglich, da die Übergänge zwischen den einfachen hyperplastischen Leukämien und den durch multiple Tumoren ausgezeichneten Krankheitsbildern sehr fließend sind.

Die Ansicht, daß die Leukämien flüssige Geschwülste seien, scheint durch eine Reihe neuzeitlicher Experimente eine Unterstützung zu erfahren. So hat B ü n g e l e r (19) z. B. Leukämien erzeugt mit Indol; S t ö b e r und W a c k e r ist es bereits schon 1910 gelungen, durch Injektion von Indol und Skatol am Kaninchenohr Epithelwucherungen zu erzeugen, die nach ihrer Angabe vom Kankroid nicht zu unterscheiden waren. Ferner ist es C a r r e l gelungen, in der Kultur embryonale Zellen durch geringen Zusatz von Indol zum Kulturmedium in Geschwulstzellen zu verwandeln. L i g n a c (20) gelang es durch chronische Benzolvergiftung Leukämien und blastomartige Erkrankungen der weißen Maus zu erzeugen. C o o k (21) hat durch Injektion von Benzpyren Karzinome, Sarkome und auch Leukämien erzeugt. In meinen Versuchen konnte ich ebenfalls Leukämien, Lymphosarkome und einen Fall eines Bafalzellenkarzinomes feststellen.

Auch die von B ü n g e l e r gemachten Beobachtungen über den Atmungsstoffwechsel von leukämischen Geweben lassen dieselbe Steigerung wie bei malignen Geschwülsten erkennen. — Die von verschiedenen Autoren mit Erfolg ausgeführten Transplantationen (22) (23) (24) (25) sprechen ebenfalls für den Tumorcharakter der Leukämie. Auch ich konnte von 10 Tieren, denen ich von leukämischen Tieren eine Leber- und Milzgewebsaufschwemmung injizierte, einen Fall feststellen, bei dem eine Maus an einer hochgradigen lymphatischen Leukämie einging. Von diesem Tier möchte ich nun einige Abbildungen bringen. Zunächst möchte ich über das Protokoll von diesem Versuch berichten.

T r a n s p l a n t a t i o n s f a l l .

Am 10. 6. 36. bekam das Tier eine intramuskuläre Injektion einer leukämischen Lebergewebsaufschwemmung. (0,5 ccm) Am 20. 10. 36. Tier lebhaft, zeigt keinerlei Tumorbildung. Am 1. 11. 36. Tier zeigt makroskopisch keine Veränderungen. Am 1. 1. 37. nimmt

das Abdomen an Größe zu. Das Tier bewegt sich wenig und macht einen recht kranken Eindruck. Am 1. 2. 37 hat das Abdomen eine ungeheure Vergrößerung erfahren. Am 7. 2. 37 starb das Tier spontan.

Sektionsbefund: Großes Abdomen, reichlich hämorrhagischer Ascites mit vielen unreifen Zellen. Milz wiegt 2,8 g und nimmt fast die Hälfte der Bauchhöhle ein. Die Leber ist ebenfalls stark vergrößert und zeigt mehrere Stecknadel- bis linfengroße grauweiße Bezirke. Es handelt sich um eine generalisierte Lymphknotenhyperplasie. Die Drüsen waren im Allgemeinen gut abgrenzbar. Auf dem Schnitt war das Gewebe weich, grauweiß bis graurot. Die Thymas war vergrößert und lymphatisch infiltriert. Auf dem Schnitt war die stark vergrößerte Milz graurot. Die Follikel sprangen als graue bis zu linfengroße Massen aus der dunkleren Pulpa deutlich hervor. Stellenweise war eine Induration des Milzgewebes feststellbar. Histologisch stellt die Milz einen strukturlosen Lymphocytenhaufen dar; ganz vereinzelt waren auch Megakaryocyten zu finden.

Leber: Im Interstitium sind kleine bis große Lymphocytenanhäufungen, die um die Gallengänge und um die Gefäße gelagert sind. Sie verlieren sich unscharf zwischen die Leberzellen hinein. Teilweise stehen sie mit anderen Lymphocytenzügen in Verbindung. Stellenweise sind die Kapillaren erweitert und ganz von Lymphocyten ausgefüllt. An einigen Stellen, besonders am Leberrande finden sich ausgedehnte Nekrosen; ob diese als Drucknekrosen aufzufassen sind, oder die Folge toxischer Schädigungen sind, ist nicht sicher zu klären.

Niere: Auch in der Niere fanden sich überall difuse lymphatische Infiltrationen. An einigen Stellen fanden sich auch hier lymphomartige Anhäufungen.

Lunge: Es handelt sich hier um massenhafte Lymphocytenanhäufungen vorwiegend peribronchial und perivaskulär.

Transplantationsmaus: Auffallend sind die große Leber und Milz.

Leber:

Mikrophotogramm der Leber vom Transplantationsfall. 45fache Vergr.

Leber:

Dieselbe Leber bei stärkerer Vergrößerung.

Es bleibt zu überlegen, welche der in der Galle enthaltenen Substanzen die leukämischen und Sarkomartigen Gewebsreaktionen veranlaßt haben. In der Galle sind bekanntlich wasserlösliche und wasserunlösliche Substanzen zu einem kolloidalen System vereinigt. Mit den wasserlöslichen Cholsäure, Glykocholsäure, Taurocholsäure, Taurocholeinsäuren und die wasserunlösliche Desoxycholsäure konnten K a t z m a n und O l i v e r leukämieartige Veränderungen an Kaninchen und an weißen Mäusen feststellen. Vielleicht sind doch gewisse Gallensäuren für die durch Galleinjektion hervorgerufenen Veränderungen verantwortlich zu machen. L ö f f l e r konnte bei, mit Choleinsäure, Desoxycholsäure und Cholsäure gefütterten Tieren bei monatelanger Beobachtung keine Krankheitsercheinungen feststellen. (27)

Die Folgen der parenteralen Cholesterinzufuhr sind an verschiedenen Tieren in großem Umfange geprüft. V e r s é (28) Die wesentlichsten Resultate waren Speicherung im R.E.S. und Riesenzellenbildung im Granulationsgewebe, nie aber Leukämien oder leukämieähnliche Bilder. Auf Grund der verschiedenen Untersuchungen konnte festgestellt werden, daß sowohl wasserlösliche wie auch wasserunlösliche Gallensäuren einen spezifischen Reiz auf den hämatopoetischen Apparat ausüben. Eine von mir durchgeführte größere Versuchsreihe mit ätherlöslichem und äthernichtlöslichem Extrakt von Trockengalle zeigte in beiden Fällen leukämieartige Gewebsveränderungen; nur im Anfang konnte ich mit dem ätherlöslichen Extrakt ein rascheres Ansteigen der Leukocyten beobachten. In der Auswirkung unterschieden sich die beiden Extrakte nicht. Es handelt sich somit um Substanzen, die sowohl im ätherlöslichen wie auch im äthernichtlöslichen Extrakt vorhanden sind.

Es sei mir gestattet, meinem verehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. Max B ü r g e r für die Überlassung des Themas und die Anregungen, die er mir bei der Durchführung der Arbeit gab, meinen besondern Dank auszusprechen. Ebenso möchte ich an dieser Stelle Herrn Prof. Dr. Edgar v. Gierke, der mir jederzeit bei der Durchsicht der Präparate mit Rat und Tat zur Seite stand, meinen herzlichsten Dank aussprechen.

Literatur.

1. J. Maisin u. M. L. Coolen C. r. Soc. Biol. Paris (1934) 117, S. 109.
2. Roffo, Zentr. f. Krebsforschung (1934) 41, S. 44.
3. G. Luden, J. Labor of Clin. Med. (1918/19) 719, 735.
4. Bierich u. Lang, Klin. Wfchr. (1936) 667.
5. Bürger, Die Klinik der Lipoidosen. Neue dtsh. Klin. Erg. Bd. 1934.
6. Bürger, Fette u. Lipoide des Blutes. Handb. d. allg. Hämatologie v. Hirschfeld u. Hittmar.
7. Bürger, Erg. inn. Med. 34, 583 (1928).
8. Wieland-Hoppe-Seyler, Z. 210, 243 (1932).
9. Cook, J. Chem. Soc. (Lond.) (1930) 1087; (1932) 466 Proc. Roy. Soc. London 113, 277 (1933).
10. Domagk, Synthetische carcinogene Substanzen. Aus dem Institut für Experimentelle Path. u. Bakteriologie d. I.G. Farbenindustrie.
11. Wacker, Hoppe-Seylers, Z. 80, 384 (1912).
12. Brandt, Biochem. Z. 288, 257 (1936)
13. Blankenburg, Die über das Unverfeifbare in Pforiaschuppen. Dissert. Bonn 1937.
14. Ellermann, Über das Wesen d. pern. Anämie. D. med. Woch. (1912) Nr. 18.
15. Seyderhelm u. Thammann, Klin. Wfchr. (1927) 1177.
16. Banti, Die Leukämien. Zbb. f. Path. u. path. Ana. (1904) XV.
17. Ribbert, Lehrbuch der Geschwülste. Bonn, 1904.
18. Benda, Makroskop. u. mikroskop. Präparate der akuten Leuk. Kongr. für innere Med. (1897) S. 535.
19. Büngeler, Frankf. Z. Path. 44, 202 (1932).
20. Lignac, G., Ztschr. f. Krankheitsforsch. Bd. 6 Heft 2 S. 97
21. Cook, American Journal of Cancer. Juni 1936.
22. Furth, J. Transmission of myeloid leucemia, its relation to myeloma. J. of exp. Med. 61. 423 (1935).
23. Furth u. Paison L. P. Leukämia coincidental with and transmissible by a spindle cell sarcoma in the mouse. J. of Path. 40, 45. 1935.
24. Furth u. Reznikow, Relation of leukemia of animals to leukemia.
25. Snijders, E. P., Neederl. Tijdschr. voor Geneek. Jrg. 70, 1926, 2. Hälfte No. 11 und Tigwjan Gie, Over leukämie by nieren en over een overentbare cavia leukose. Amsterdam 1927.

26. K a t z m a n n u. O l i v e r, Über die Beziehung zwischen Leukocytose und Leukämie. Noch nicht veröffentlichte Untersuchungen.
27. L ö f f l e r, H o p p e - S e y l e r s, Z. 178, 186. (1928).
27. V e r s é, Verh. dtich. path. Gef. Würzburg 1925.

Lebenslauf.

Ich, Rita Uiker, wurde am 3. April 1913 in Bruchfal (Baden) als Tochter des Reichsbahninspektors Hans Uiker und seiner Ehefrau Maria, geborene Reinert, geboren.

Nach Ablegung der Reifeprüfung an der Fichte-Oberrealschule in Karlsruhe i. B. im Februar 1932 begann ich mit dem Studium der Medizin. Meine vorklinischen Semester verbrachte ich an den Universitäten Freiburg und Heidelberg. An letzterer bestand ich Ende des Sommersemesters 1934 die ärztliche Vorprüfung. Meine klinischen Semester verbrachte ich an den Universitäten Freiburg und Bonn und bestand im W.H. 1937/38 das ärztliche Staatsexamen.

